

# Imuran of purinethol

## DIENST GASTROENTEROLOGIE GZA

### Artsen:

Dr. P. Borgers  
Dr. Th. Botelberge  
Dr. I. Buytaert  
Dr. I. Dero  
Dr. B. De Schepper

Dr. H. Fierens  
Dr. I. Maurissen  
Dr. D. Sprengers  
Dr. D. Staessen  
Dr. P.H. Steger

Dr. F. Van de Mierop  
Dr. S. Van Outryve  
Dr. J. Wauters

### Praktijken:

Sint Augustinusziekenhuis, Wilrijk	Tel 03/ 443.36.57
Sint Jozefziekenhuis, Mortsel	Tel 03/ 444.12.07
Sint Vincentiusziekenhuis, Antwerpen	Tel 03/ 285.28.15
Antwerp Medical Building, Antwerpen	Tel 03/ 216.30.90
Medibe, Beveren	Tel 03/ 775.11.11
Medisch Centrum, Wijnegem	Tel 03/ 353.44.96
Medi-Z, Zwijndrecht	Tel 03/ 689.58.95
Medisch Centrum, Antwerpen	Tel 03/ 203.52.00
Dokterspraktijk Het Eilandje, Antwerpen	Tel 03/ 770.81.75



Dienst gastroenterologie GZA

Imuran of purinethol

# Info bij gebruik van imuran of purinethol.

Imuran of purinethol wordt door uw arts voorgeschreven in het kader van inflammatoir darmlijden. Om gebruik van deze medicatie op de juiste manier te laten verlopen schreven we dit info blad. Een juist inzicht garandeert een beter succes én een veiliger gebruik.

**1/ Opstart:** de gebruikelijke dosis is 2 tot 2.5 mg per kg lichaamsgewicht. Omwille van mogelijke neveneffecten op beenmerg, lever en pancreas wordt de dosis van imuran of purinethol, echter traagjes opgebouwd. Dit onder nauwkeurige follow up van de bloedwaarden. De stapsgewijze optitratie van de medicatie kan dan ook enkel gebeuren als de controle bloedname geruststellend is en er groen licht wordt gegeven voor de volgende stap. Het schema wordt u meegegeven bij het initieel voorschrijven van imuran of purinethol.

Opletten: er zijn imuran tabletten van 25 en 50 mg. Purinethol tabletten zijn er enkel van 50 mg. Soms zal gekozen worden voor een genetisch nazicht van het TPMT-polymorfisme, uitgevoerd in Gasthuisberg, Leuven, alvorens de imuran of purinethol behandeling op te starten. De beslissing hieromtrent ligt bij uw voorschrijvende arts. Er is geen terugbetaling voor deze test die ongeveer 50 Euro kost. Dan dient een stapsgewijze opstart niet noodzakelijkerwijze te gebeuren.

**2/ Inname:** omdat sommige mensen misselijkheid vermelden op de inname van imuran of purinethol, wordt aangeraden om de medicatie voor het slapen gaan in te nemen. Soms helpt het ook om de medicatie te spreiden over de dag.

**3/ Zonne expositie:** vermijden van volle zon blootstelling, beschermen van huid met de nodige crèmes. Vooral op lange termijn is dit belangrijk. Er is immers een licht verhoogd risico op huidkanker indien deze maatregelen niet worden in acht genomen.

**4/ Andere medicatie:** nooit imuran/purinethol innemen tesamen met allopurinol.

**5/ Lange termijn:** om neveneffecten uit te sluiten dient een bloedname om de vier maanden te worden uitgevoerd, zolang imuran of purinethol worden ingenomen.

Alhoewel studies niet eensluidend zijn, is er door de inname van imuran of purinethol een licht verhoogde kans op het ontwikkelen van klierkanker. Het risico blijft echter zeer laag.

**6/ Zwangerschap:** te bespreken met arts wanneer de situatie zich voordoet doch op dit moment geen reden om imuran of purinethol te onderbreken.

**7/ Vaccinaties:** toediening van levende vaccins is NIET toegelaten. Te bespreken met voorschrijvende arts.