

Types van sedatie

DIENST GASTROENTEROLOGIE GZA

Artsen:

Dr. P. Borgers
Dr. Th. Botelberge
Dr. I. Buytaert
Dr. I. Dero
Dr. B. De Schepper

Dr. H. Fierens
Dr. I. Maurissen
Dr. D. Sprengers
Dr. D. Staessen
Dr. P.H. Steger

Dr. F. Van de Mierop
Dr. S. Van Outryve
Dr. J. Wauters

Praktijken:

Sint Augustinusziekenhuis, Wilrijk	Tel 03/ 443.36.57
Sint Jozefziekenhuis, Mortsel	Tel 03/ 444.12.07
Sint Vincentiusziekenhuis, Antwerpen	Tel 03/ 285.28.15
Antwerp Medical Building, Antwerpen	Tel 03/ 216.30.90
Medibe, Beveren	Tel 03/ 775.11.11
Medisch Centrum, Wijnegem	Tel 03/ 353.44.96
Medi-Z, Zwijndrecht	Tel 03/ 689.58.95
Medisch Centrum, Antwerpen	Tel 03/ 203.52.00
Dokterspraktijk Het Eilandje, Antwerpen	Tel 03/ 770.81.75



Dienst gastroenterologie GZA

Sedatie bij onderzoeken.

Wanneer endoscopische onderzoeken wenselijk zijn, kan op uw vraag sedatie worden gegeven. We onderscheiden volgende vormen van sedatie:

1 = geen sedatie

2 = anxiolyse: patiënt is enigszins slaperig

3 = matige sedatie, ogen gesloten, maar patiënt reageert op aanspreken en aanraken.

4 = diepe sedatie, alleen wakker op herhaalde of pijnlijke prikkels

5 = algemene anesthesie

* Indien u kiest voor **geen sedatie**, dan zal u uiteraard onmiddellijk na het onderzoek naar huis of naar uw kamer kunnen. Dan zijn er ook geen extra risico's aanwezig die een gevolg zijn van de sedatie.

* Indien u kiest voor **anxiolyse of matige sedatie**, dan zal een intraveneuze injectie van een medicatie noodzakelijk zijn. Vermits deze medicatie u niet enkel slaperig maakt (in soms onvoorspelbare manier) doch ook een invloed heeft op uw bloeddruk en ademhaling, is monitoring noodzakelijk.

Tijdens en na het onderzoek worden deze parameters dan ook opgevolgd.

U moet na het onderzoek een poos in observatie blijven, gemiddeld een half uur. De onderzoeken kunnen nog steeds ambulante, zonder opname in het ziekenhuis gebeuren.

U mag na het onderzoek niet met de auto rijden en dit geldt voor de rest van de dag.

* Indien u kiest voor **diepe sedatie**, dan zal een anaesthesist aanwezig moeten zijn voor het onderzoek, want er wordt dan diprivan toegediend. Diprivan heeft iets meer risico op het uitlokken van ademhalingsonderdrukking of bloeddruk problemen.

Daarom dient een anesthesist aanwezig te zijn voor het onderzoek. Dit betekent dan ook dat u opgenomen wordt voor minstens een halve dag, in het dagziekenhuis indien u een ambulante patient bent.

Er dient ook een recent EKG in het dossier aanwezig te zijn, wanneer u de leeftijd van vijftig bereikt heeft.

U mag na het onderzoek niet met de auto rijden en dit geldt voor de rest van de dag.

Meestal wordt er geen intubatie van de luchtwegen uitgevoerd, tenzij er iets gebeurd tijdens de ingreep dat dit nodig acht.

* **Algemene anesthesie** is een keuze die uw behandelend arts voor u stelt. Het betekent dat voor het onderzoek niet enkel een anesthesist nodig is doch systematisch ook een intubatie van de luchtwegen noodzakelijk. Meestal is een overnachting na de ingreep noodzakelijk.